

# Contralac 20



Samenstelling	Bevat per tablet 2 mg metergoline.
Eigenschappen	<p>Prolactine is het hormoon dat verantwoordelijk is voor de melkuitscheiding en wordt afgescheiden door de hypofyse. De secretie wordt gereguleerd door 2 neurosecreten, namelijk de Prolactine Inhibiting Factor (voornamelijk dopamine; remt de afscheiding van prolactine) en Prolactine Releasing Factor (voornamelijk serotonine; bevordert de uitscheiding van prolactine).</p> <p>Metergoline in Contralac bezit een snelle en sterke anti-serotonine werking. De remming van de afscheiding van prolactine resulteert binnen enkele dagen in het afnemen van de gebruikelijke symptomen die ontstaan bij schijnvrucht of ongewenste post-partum lactatie, zoals gedragsveranderingen, zwelling van de melkklieren en afscheiding van sereus vocht of melk uit de melkklieren. Indien toegepast in de aangegeven dosering oefent metergoline, in tegenstelling tot andere prolactine-remmende stoffen, geen dopamine werking uit. Hierdoor wordt braken als bijwerking tot een minimum beperkt.</p>
Doeldier	Hond
Indicaties	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Onderbreking van de lactatie en andere symptomen bij schijnzwangerschap.</li> <li>- Onderbreking van post-partum lactatie.</li> </ul>
Toediening/dosering	Teven: Gedurende 4 dagen 0,1 mg metergoline per kg l.g., tweemaal per dag, wat overeenkomt met 's morgens en 's avonds 1 tablet per 20 kg l.g. Indien de symptomen niet volledig verdwenen zijn de behandeling 4 dagen voortzetten.
Contra-indicaties	Geen
Bijwerkingen	Lichte vorm van diarree, excitatie en agitatie en braken aan het begin van de behandeling is mogelijk.
Waarschuwingen	Niet toedienen aan honden lichter dan 5 kg.
Bewaarcondities/Houdbaarheid	Donker en tussen 15-25°C bewaren. Houdbaar tot 2 jaar na productiedatum.
Verpakking	Doos met 2 blisters à 8 tabletten
Registratienummer	REG NL 2272
Kanalisatie	UDA
Artikelnummer	90.003.65