

# BIJSLUITER

## VETADERM®

### emulsie voor cutaan gebruik bij katten en honden

#### Registratiehouder:

AST Beheer B.V.  
Wilgenweg 7  
3421 TV Oudewater

#### De fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.  
Forellenweg 16  
4941 SJ Raamsdonksveer

#### **BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Vetaderm, emulsie voor cutaan gebruik bij katten en honden.

#### **GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN**

Per ml

##### **Werkzaam bestanddeel:**

Neomycinesulfaat	1,17 mg
Hydrocortisonacetaat	1,34 mg

##### **Hulpstoffen:**

Natrium methylparahydroxybenzoaat (E218)

#### **INDICATIES**

##### Hond en kat:

- pyo(traumatische) dermatitis veroorzaakt door *Staphylococcus aureus*;
- brandwonden van de eerste graad

##### Kat:

- chronische dermatitis bij de kat veroorzaakt door *Staphylococcus* spp.

#### **CONTRA-INDICATIES**

Geen.

#### **BIJWERKINGEN**

Na langdurig gebruik kan superinfectie met gisten en schimmels plaatsvinden.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

#### **DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Hond en kat.

#### **DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN TOEDIENING**

Cutaan gebruik.

Schudden voor gebruik.

Aangetaste plekken 2 - 3 maal per dag inspraken, bij verbetering 2 - 3 maal per week, gedurende maximaal 14 dagen.

#### **AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING**

Niet van toepassing.

#### **WACHTTIJD**

Niet van toepassing.

#### **SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN**

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:.

#### **SPECIALE WAARSCHUWINGEN**

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

##### Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie.

##### Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

#### **SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIETGEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

#### **DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN**

18 oktober 2012

#### **OVERIGE INFORMATIE**

Verpakkingsgroottes:

Flacon van 60 ml

Flacon van 120 ml

Flacon van 500 ml

REG NL 9655

#### **KANALISATIE**

UDD



AST Farma B.V.  
Oudewater